

ADULTES BIEN PORTANTS SANS COMORBIDITÉ

1

DOSE DE DÉPART POUR
PATIENT NAÏF D'OPIOÏDE



2

SI ECHEC DE LA PEC INITIALE OU
MAJORATION DE LA SYMPTOMATOLOGIE

TRAITEMENT DE FOND dans
PSE ou perfusion continue
avec régulateur de débit
(250ml)

PAP perfusettes IV ou SC
(sans diluer)

Traitement de fond dans PSE
ou perfusion continue avec
régulateur de débit (250ml)

PAP perfusettes IV ou SC
(sans diluer)

Morphine 20 mg +
Midazolam 10 mg/24h +
Métoclopramide 20 mg 3 J

Morphine 3 mg +
Midazolam 3 mg

Morphine 30 mg +
Midazolam 15 mg/24h

Morphine 5 mg +
Midazolam 3 mg

Ou

Ou

Ou

Ou

Morphine 20 mg +
Clonazépam 2 mg/24h +
Métoclopramide 20 mg 3 J

Morphine 3 mg +
Clonazépam 0,5 mg

Morphine 30 mg +
Clonazépam 4 mg/24h

Morphine 5 mg +
Clonazépam 1 mg

Ou

Ou

Ou

Ou

Morphine 20 mg +
Diazépam 10 mg/24h +
Métoclopramide 20 mg 3 J

Morphine 3 mg +
Diazépam 5 mg

Morphine 30 mg +
Diazépam 20mg/24h

Morphine 5 mg +
Diazépam 10 mg

ADULTES AVEC COMORBIDITÉS OU PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 70 ANS AVEC OU SANS COMORBIDITÉ

1

**DOSE DE DÉPART POUR
PATIENT NAÏF D'OPIOÏDE**

**TRAITEMENT DE FOND dans
PSE ou perfusion continue avec
régulateur de débit
(250ml)**

**PAP perfusettes IV ou SC
(sans diluer)**

**Morphine 10 mg +
Midazolam 5 mg/24h +
Métoclopramide 10 mg 3 J**

**Morphine 2 mg +
Midazolam 2 mg**

Ou

Ou

**Morphine 10 mg +
Clonazépam 1 mg/24h +
Métoclopramide 10 mg 3 J**

**Morphine 2 mg +
Clonazépam 0,3 mg**

Ou

Ou

**Morphine 10 mg +
Diazépam 5 mg/24h +
Métoclopramide 10 mg 3 J**

**Morphine 2 mg +
Diazépam 2 mg**

2

**SI ECHEC DE LA PEC INITIALE OU
MAJORATION DE LA SYMPTOMATOLOGIE**

**Traitement de fond dans PSE
ou perfusion continue avec
régulateur de débit
(250ml)**

**PAP perfusettes IV ou SC
(sans diluer)**

**Morphine 15 mg +
Midazolam 7 mg/24h**

**Morphine 3 mg +
Midazolam 3 mg**

Ou

Ou

**Morphine 15 mg +
Clonazépam 2 mg/24h**

**Morphine 3 mg +
Clonazépam 1 mg**

Ou

Ou

**Morphine 15 mg +
Diazépam 10 mg/24h**

**Morphine 3 mg +
Diazépam 5 mg**