

## TRAITEMENT MEDICAMENTEUX SYMPTOMATIQUE POUR DYSPNEE ET ENCOMBREMENT EN PHASE TERMINALE

Mise à jour :  
09/04/20

PATIENTS	MOLECULES	VOIES	TYPES DE TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE			
			Traitement de fond	PAP	Sédation proportionnée	Sédation profonde à durée indéterminée
			PSE IV ou SC Ou perfusion continue + Régulateur de débit (250 mL)	Perfusette IV Ou injection SC ou IM (sans diluer)	Titration IV 10 mL, mL par mL / 2 min Ou Perfusette IV Ou injection IM	PSE IV ou SC Ou perfusion continue + Régulateur de débit (250 mL)
<b>ADULTE SANS COMORBIDITE</b>	Morphine	IV, IM, SC	<b>20 mg/j</b>	<b>3 mg</b>	<b>10 mg</b>	<b>30 mg/J</b>
	Midazolam Hypnovel®	IV, IM, SC	<b>10 mg/j</b>	<b>3 mg</b>	<b>5 mg</b>	<b>12 fois la dose titrée/J</b>
	+ Ou Clonazépam Rivotril®	IV, IM, SC	<b>2 mg/j</b>	<b>0,5 mg</b>	<b>2 mg</b>	<b>4 fois la dose titrée/J</b>
	+ Ou Diazépam Valium®	IV, IM	<b>10 mg/j</b>	<b>5 mg</b>	<b>10 mg</b>	
	+ Ou Clorazépate Tranxène®	IV, IM	<b>20 mg/j</b>	<b>10 mg</b>	<b>20 mg</b>	
	+ Ou Chlorpromazine Largactil®	IV, IM	<b>25 mg/j</b>	<b>12 mg</b>	<b>25 mg</b>	
<b>ADULTE AVEC COMORBIDITES  OU AGE 70+ ANS AVEC OU SANS COMORBIDITE</b>	Morphine	IV, IM, SC	<b>10 mg/j</b>	<b>2 mg</b>	<b>5 mg</b>	<b>15 mg/j</b>
	Midazolam Hypnovel®	IV, IM, SC	<b>5 mg/j</b>	<b>2 mg</b>	<b>2,5 mg</b>	<b>12 fois la dose titrée/J</b>
	+ Ou Clonazépam Rivotril®	IV, IM, SC	<b>1 mg/j</b>	<b>0,3 mg</b>	<b>1 mg</b>	<b>4 fois la dose titrée/J</b>
	+ Ou Diazépam Valium®	IV, IM	<b>5 mg/j</b>	<b>2 mg</b>	<b>5 mg</b>	
	+ Ou Clorazépate Tranxène®	IV, IM	<b>10 mg/j</b>	<b>5 mg</b>	<b>10 mg</b>	
	+ Ou Chlorpromazine Largactil®	IV, IM	<b>12,5 mg/j</b>	<b>5 mg</b>	<b>12,5 mg</b>	

PAP : Prescriptions Anticipées Personnalisées / PSE : Pousse-seringue Electrique / I.V. : Intraveineuse / S.C. : Sous-cutanée